

# NESTOSYL®

## Nestosyl, hydrofobe crème

Pramocaine hydrochloride 10 mg/g, zinkoxide 100 mg/g

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u:**

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Pramocaine hydrochloride werkt lokaal pijn- en jeukstillend. Zinkoxide heeft een dekkende, verkoelende en zwak adstringerende (= samentrekkende) werking. Samenvattend werkt Nestosyl pijn- en jeukverlichtend.

Nestosyl kan worden gebruikt ter verlichting van plaatselijke jeuk, insectenbeten en oppervlakkige schaaf- en snijwonden.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

#### Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Nestosyl is niet geschikt voor toepassing op slijmvlieszen. Langdurige toepassing op grote huidoppervlakken moeten worden vermeden. Bij grove overdosering bestaat de mogelijkheid van ernstige systemische bijwerkingen ten gevolge van absorptie van pramocaine. Indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren uw arts raadplegen. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U bent allergisch voor pramocaine, zinkoxide of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

#### Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens borstvoeding.

#### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bevolting van deze functies valt niet te verwachten.

#### Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nestosyl

Nestosyl bevat arachide-olie (pinda-olie), soja-lecithine en wolvet.

Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u overgevoelig bent voor pinda's en/of soja. Wolvet kan plaatselijke huidirritaties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

### 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Op de beschadigde huid brengt men een dikke laag Nestosyl crème aan. Vervolgens wordt de betreffende plek – zo nodig – afgedekt met verbandgaas of een pleister. Deze behandeling wordt één- à tweemaal per dag herhaald. Bij plaatselijke kortdurende jeuk of insectenbeten brengt men enige malen per dag een dunne laag crème aan.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

#### Huid- en onderhuidsaandoeningen:

Frequentie: niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Contactallergie of irritatie door pramocaine, een van de conserveermiddelen of andere bestanddelen van de basis kan voorkomen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren. Op deze wijze bewaard is Nestosyl houdbaar tot en met de op de verpakking aangegeven datum. De datum staat op de verpakking en de tube aangegeven achter de woorden "niet te gebruiken na" en in de zoom van de tube onder de afkorting: "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de tube nog 12 maanden houdbaar.

### 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

#### Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn:

pramocaine en zinkoxide

De hulpstoffen in dit middel zijn:

benzalkoniumbromide, 8-hydroxychinoline, wolvet, witte vaseline, arachide-olie (pinda-olie), soja-lecithine, gezuiverd water.

#### Hoe ziet Nestosyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Nestosyl is verpakt in een aluminium tube van 15 of 30 gram. De tube is verpakt in een kartonnen doosje.

#### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Remark Pharma  
Industrieweg 24  
7949 AK Rogat

Fabrikant:  
Qualiphar NV  
Rijksweg 9  
B-2880 Bornem  
België

In het register ingeschreven  
onder RVG 00591

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2018